

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1994 අගෝස්තු
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1994

රසායන විද්‍යාව I
CHEMISTRY I

ඔ. පු. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කඩදසි දෙකකින් යුක්ත වේ. පිළිතුරු කැපවීමට
පෙර ඒවා සිටු ආක අනුව පිළියෙල කර ගන්න.

උක්කර පත්‍රයේ දක්වා ඇති ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

මේ පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු කැපවීමට ඔබ වැයම් කළ යුතු යි. එක් එක් ප්‍රශ්නයට එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රතිචාර පහක් ඇති නමුදු නිවැරදි පිළිතුර ඉන් එකක් පමණකි. ප්‍රශ්නයට නොද ම පිළිතුර කැපවීමට ඔබ එක් ප්‍රතිචාරයක් කෝරා ගත් පසු එය උක්කර පත්‍රයේ දක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න. එහෙත් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් අපහසු බව කැතුණොත් එය මත කැර දෙවනු ව සලකා බැලීමට කල් කඩන්න.

$$\begin{aligned} \text{සර්වත්‍ර වායු නියතය, } R &= 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \\ &= 0.082 \text{ l atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

ඔ. පු. ඉංග්‍රීසි හෝ ඩෛස් අකුරු පහත සඳහන් අර්ථ දෙන අයුරින් කෙටි පොදුම් වශයෙන් භාවිත කර ඇත.

aq = ප්ලීය ; atm = වායු ගෝල

C = පෙල්සියස් හෝ සෙන්ටිග්‍රේඩ් හෝ කුලෝම්


g = වායු හෝ ස්ඵම් ; l = ද්‍රව හෝ ලීටර්

mol dm⁻³ = කහ වෙසිම්වරයට මවුල


mol l⁻¹ = ලීටරයට මවුල ; s = කහ හෝ කක්පර

ඉවහන් කෙටි පොදුම් හද සම්මත භාවිතයට අනුව ම වේ.

- පරමාණුක සුමාංකය 50 වන මූලද්‍රව්‍යයේ ප්‍රධාන සංයුක්තය
(1) 1 සහ 2 වේ. (2) 2 සහ 3 වේ. (3) 1 සහ 3 වේ. (4) 2 සහ 4 වේ. (5) 3 සහ 5 වේ.
- ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය $1.3 \times 10^{-7} \text{ mol cm}^{-3}$ වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම සාන්ද්‍රණය මූලික SI එකක අනුව
(1) $1.3 \times 10^{-6} \text{ mol m}^{-3}$ වේ. (2) $1.3 \times 10^{-4} \text{ mol m}^{-3}$ වේ.
(3) $1.3 \times 10^{-1} \text{ mol m}^{-3}$ වේ. (4) $1.3 \times 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$ වේ.
(5) $1.3 \times 10^{-1} \text{ mol l}^{-1}$ වේ.
- නියත උෂ්ණත්වයේ දී පිරිහනය වැඩි කරන විට, මින් කුමන සමතුලිතය දකුණටට ගැමට කැමුරු වේ ද?
(1) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ (2) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
(3) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$ (4) $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g})$
(5) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
- පහත දක්වන සමතුලිතය සලකන්න.
 $\text{AB}_2(\text{g}) + 2\text{AB}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{A}_3\text{B}_4(\text{g})$
AB₂(g) සහ AB(g), 1 : 2 යන මවුල අනුපාතයෙන් සංවෘත භාජනයක් තුළ තබා එක්කරා උෂ්ණත්වයක දී සමතුලිත තත්ත්වයට එළඹෙන්නට ඉඩ හරින ලදී. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී AB₂(g) වලින් 50% ක් වායුමය මිශ්‍රණයෙහි ඉතිරි ව තිබේ. මෙම මිශ්‍රණයෙහි A₃B₄(g) මවුල භාගය
(1) $\frac{1}{4}$ වේ. (2) $\frac{1}{3}$ වේ. (3) $\frac{1}{2}$ වේ.
(4) $\frac{1}{5}$ වේ. (5) ඉහත සඳහන් එකක්වත් නො වේ.

5. $C_3H_7F_5$ යන අණුක ධුලය ඇති සරල-දම සංයෝග සංඛ්‍යාව
 (1) 2 වේ. (2) 3 වේ. (3) 4 වේ.
 (4) 5 වේ. (5) ඉහත සඳහන් එකක්වත් නො වේ.
6. මීන් කුමක් ජලීය $AgNO_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නො කරයි ද?
 (1) $(C_2H_5)_3CCl$ (2) CH_3COBr (3) $ClCH_2COCl$
 (4) $C_6H_5CH_2Cl$ (5) $CH_2 = CHCl$
7. මීන් කුමක් ජලීය $NaOH$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නො කරයි ද?
 (1) Br_2 (2) Zn (3) F_2 (4) Fe (5) Sn
8. මීන් කුමක් ජලය සමඟ පැහැදිලි වී සෙසොන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වයි ද?
 (1) $CsCl$ (2) RbF (3) $BiCl_3$ (4) $SrCl_2$ (5) BaI_2
9. $CH_3CH_2CH_2OH$ සහ CH_3CH_2OH සහභවයන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා මීන් කුමක් උපයෝගී කර ගත හැකි ද?
 (1) HI (2) H_2SO_4 (3) Br_2 / P
 (4) $Br_2 /$ ජලීය $NaOH$ (5) $I_2 / CHCl_3$
10. X පරමාණුව X^{2-} ඇතායනය සාදයි. Y පරමාණුව Y^{3-} ඇතායනය සාදයි. මෙම ඇතායන දෙකෙහි අන්තිම උප-ශක්ති මට්ටමෙහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් n_X සහ n_Y වේ. n_X සහ n_Y අතර ඇති සම්බන්ධය කුමක් ද?
 (1) $n_X > n_Y$ (2) $n_Y > n_X$ (3) $n_Y - n_X = 1$
 (4) $n_X = n_Y = 8$ (5) $n_X = n_Y = 6$
11. සියුම් වායු ස්කන්ධයක අණුවල මධ්‍යතන වාලක ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් වන මීන් කුමන ප්‍රකාශය වඩාත් ම උචිත වේ ද?
 (1) එය පීඩනය සමඟ වැඩි වේ. (2) එය පීඩනය සමඟ අඩු වේ.
 (3) එය පරිමාව සමඟ වෙනස් වේ. (4) එය උෂ්ණත්වය සමඟ වෙනස් වේ.
 (5) ඉහත සඳහන් සියලුම ප්‍රකාශ සාවද්‍ය වේ.
12. රොම්බොයා සල්ෆර් සම්බන්ධයෙන් වන මීන් කුමන ප්‍රකාශය වඩාත් ම උචිත වේ ද?
 (1) එය සල්ෆර් පරමාණුවලින් පැදී දීර්ඝ දමවලින් සමන්විත වේ.
 (2) එය සල්ෆර් පරමාණුවලින් පැදී S_8 දමවලින් සමන්විත වේ.
 (3) එය වළංකාර S_8 අණුවලින් සමන්විත වේ.
 (4) එය වකුෂ්කලීය S_8 අණුවලින් සමන්විත වේ.
 (5) එය එකක් හැර එකක් S_8 වළංවලින් හා S_8 දමවලින් සමන්විත වේ.
13. බෙන්සීන්වලින් ආරම්භ කරමින්  $^{14}COOH$ සංශ්ලේෂණය සිදුවීමට අවශ්‍ය වී සිටී.
 මේ සඳහා වඩාත් ම උචිත ආරම්භක පියවර වන්නේ මීන් කුමක් ද?
 (1) බෙන්සීන් $CH_3COCl /$ නිර්ජලීය $AlCl_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම
 (2) බෙන්සීන් Cl_2 / Fe සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම
 (3) බෙන්සීන් සාන්ද්‍ර $HNO_3 /$ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම
 (4) බෙන්සීන් සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම
 (5) බෙන්සීන් $CH_3Cl /$ නිර්ජලීය $AlCl_3$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම

14. මීන් කුමක්, C_6H_6 සහ C_6D_6 යන මේවායින් සමන්විත ද්‍රවයක පද්ධතියේ වාෂ්ප පීඩන විචලනයට අනුරූප වේ ද? ($D =$ ඩියුටරියම්)



$P =$ පද්ධතියේ වාෂ්ප පීඩනය
 $x_{C_6H_6} =$ බෙන්සීන් මවුල භාගය


15. Na_2CO_3 , $NaHCO_3$, $CsClO_4$ සහ $(NH_4)_2SO_4$ යන මේවායේ 0.1 mol dm^{-3} ජලීය ද්‍රාවණ සලකන්න. මේ ද්‍රාවණවල pH අගයයන් මෙසේ වන්නේ වේ:

- (1) $CsClO_4 \text{ (aq)} > (NH_4)_2SO_4 \text{ (aq)} > NaHCO_3 \text{ (aq)} > Na_2CO_3 \text{ (aq)}$.
- (2) $NaHCO_3 \text{ (aq)} > Na_2CO_3 \text{ (aq)} > (NH_4)_2SO_4 \text{ (aq)} > CsClO_4 \text{ (aq)}$.
- (3) $Na_2CO_3 \text{ (aq)} > (NH_4)_2SO_4 \text{ (aq)} > CsClO_4 \text{ (aq)} > NaHCO_3 \text{ (aq)}$.
- (4) $Na_2CO_3 \text{ (aq)} > NaHCO_3 \text{ (aq)} > CsClO_4 \text{ (aq)} > (NH_4)_2SO_4 \text{ (aq)}$.
- (5) $NaHCO_3 \text{ (aq)} > Na_2CO_3 \text{ (aq)} > CsClO_4 \text{ (aq)} > (NH_4)_2SO_4 \text{ (aq)}$.

16. මීන් කුමන ද්‍රාවණය වඩාත් ම ප්‍රබල ලෙස ආම්ලික වේ ද?

- (1) SO_2 ද්‍රාවණය කරන ලද ජලය
- (2) NO_2 ද්‍රාවණය කරන ලද ජලය
- (3) SO_2 සහ NO_2 ද්‍රාවණය කරන ලද ජලය
- (4) H_2S ද්‍රාවණය කරන ලද ජලය
- (5) Cl_2O ද්‍රාවණය කරන ලද ජලය

- 17.




මි IUPAC නාමය






- (1) 6-බ්රෝමෝ-3-කාබොක්සොපොස්ටිපිනෝල් වේ.
 - (2) 2-බ්රෝමෝ-5-කාබොක්සොපොස්ටිපිනෝල් වේ.
 - (3) ප්‍රොපිල් 4-බ්රෝමෝ-5-හයිඩ්‍රොක්සිබෙන්සොයිල් වේ.
 - (4) ප්‍රොපිල් 4-බ්රෝමෝ-3-හයිඩ්‍රොක්සිබෙන්සොයිල් වේ.
 - (5) 2-බ්රෝමෝ-5-කාබොක්සොපොස්ටි-1-හයිඩ්‍රොක්සිබෙන්සීන් වේ.
18. වීලීන ඇමෝනියම් සල්ෆේට් සහ ඇයුම්නියම් ලෝහය අතර වන ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් මීන් කුමන ප්‍රකාශය වඩාත් ම උචිත වේ ද?
- (1) සල්ෆේට් ඉක්කන වේ.
 - (2) හයිඩ්‍රජන් ඉක්කන වේ.
 - (3) ඇමෝනියා ඉක්කන වේ.
 - (4) හයිඩ්‍රජන් සහ නයිට්‍රජන් ඉක්කන වේ.
 - (5) හයිඩ්‍රජන් සහ ඇමෝනියා ඉක්කන වේ.

19. පහත දැක්වූ ජලය සඳහා මින් කුමන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ ද?
- (1) pH අගය 7 ට පහළ විය හැකි ය. (2) pOH අගය 7 ට පහළ විය හැකි ය.
 (3) $[H_3O^+] > K_w$ (4) $[OH^-] > K_w$
 (5) $[H_3O^+] > [OH^-]$
20. කැල්සියම්, මැග්නීසියම් සහ නැට්‍රියම් යන මෙවැනි පරමාණුක අරයන්
- (1) $Ca > Na > Mg$ යන පරිපාටිය අනුව අවරෝහණය වේ.
 (2) $Na > Ca > Mg$ යන පරිපාටිය අනුව අවරෝහණය වේ.
 (3) $Ca > Mg > Na$ යන පරිපාටිය අනුව අවරෝහණය වේ.
 (4) $Mg > Na > Ca$ යන පරිපාටිය අනුව අවරෝහණය වේ.
 (5) $Na > Mg > Ca$ යන පරිපාටිය අනුව අවරෝහණය වේ.
21. මින් කුමන අණුව ධ්‍රැවීය නොවේ ද?
- (1) NH_3 (2) HCl (3) CO_2 (4) SO_2 (5) H_2S
22. ඔක්සිජන් මවුල 1 ක සම්පූර්ණ දහනය සඳහා අවශ්‍ය වන O_2 මවුල සංඛ්‍යාව
- (1) 9 වේ. (2) 12 වේ. (3) 12.5 වේ. (4) 24 වේ. (5) 25 වේ.
23. විසිරණශීලී සමස්ථානිකයක අර්ධ-ආයු කාලය අවුරුදු 20 ක් වේ. අවුරුදු 100 ක් තුළ විසිරණශීලී සමස්ථානිකයේ ආරම්භ ප්‍රමාණයෙන් කිනම් ප්‍රතිශතයක් ජීවත් වේ ද?
- (1) 80% පමණ (2) 85% පමණ (3) 90% පමණ (4) 97% පමණ (5) 99% පමණ
24. $Ba_3(PO_4)_2$ හි K_{sp} වල ඒකක
- (1) $mol\ l^{-1}$ වේ. (2) $mol^3\ l^{-5}$ වේ. (3) $mol^4\ l^{-4}$ වේ. (4) $mol^5\ dm^{-3}$ වේ. (5) $mol^3\ dm^{-3}$ වේ.
25. පහත සඳහන් සමතුලිත සලකුණ.
- $$XO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons XO_3(g) \quad K_p = K_1$$
- $$2XO_3(g) \rightleftharpoons 2XO_2(g) + O_2(g) \quad K_p = K_2$$
- K_1 සහ K_2 අතර සම්බන්ධය
- (1) $K_1 = K_2$ වේ. (2) $K_1^2 = K_2$ වේ. (3) $K_2^2 = K_1$ වේ. (4) $K_2 = \frac{1}{K_1}$ වේ. (5) $K_2 = \frac{1}{K_1^2}$ වේ.
26. ජලීය මාධ්‍යයේ දී $H_2S_2O_8$ සහ කොපර් අතර සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාවේ දී
- (1) සල්ෆරික් ඔක්සිකරණ අංකය + 8 සිට + 6 දක්වා වෙනස් වේ.
 (2) සල්ෆරික් ඔක්සිකරණ අංකය + 7 සිට + 4 දක්වා වෙනස් වේ.
 (3) සල්ෆරික් ඔක්සිකරණ අංකය + 6 සිට + 4 දක්වා වෙනස් වේ.
 (4) කොපර්හි ඔක්සිකරණ අංකය 0 සිට + 1 දක්වා වෙනස් වේ.
 (5) ඉහත සඳහන් කිසිවක් සිදු නොවේ.
27. A නමැති අකාබනික සංයෝගය හඳුනා ගැනීමට HCl හි ද්‍රවණය වෙමින් B නමැති වායුවක් ලබා දෙයි. A හඳුනා ගැනීමට H_2SO_4 සමඟ B වායුව ම ලබා දෙන නමුත් පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලබා නොදෙයි. B ආම්ලිකතාව $K_2Cr_2O_7$ ද්‍රාවණයක වර්ණය වෙනස් කරයි. B ජලීය $AgNO_3$ ද්‍රාවණයක් සමඟ කළ අවස්ථාවක් දෙයි. බන්තන් දැල්වීමේදී A හා B පැහැයක් නොදෙයි. A මින් කුමක් විය හැකි ද?
- (1) BaS (2) $CuSO_3$ (3) Cu_2O_3 (4) SrS (5) $SrSO_3$

28. C නමැති කාබනික සංයෝගය ඔක්සිකාරක තත්වයට යටත් දී ඔක්සිජන්වලින් සහ වීට, ප්‍රොපෝනේන් සහ එතේන්වලින් අම්ලය 2:1 යන මූල අනුපාතයෙන් ලබා දුණි. C මින් කුමක් විය හැකි ද?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ (2) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_3$
 (3) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_3$ (4) $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$
 (5) $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CHCOOH}$

29.  සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට අල්කම් වශයෙන් ඉඩ ඇත්තේ මින් කුමන එකට ද?

- (1)  (2)  (3) 
 (4)  (5) 

30. කාබනික සංයෝගයක් ගුණාත්මක වී විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී ලැබෙන්නේ නික්සාරකයට FeSO_4 එකතු කර මිශ්‍රණය කරවා, ඊළඟට කහුක H_2SO_4 එකතු කරන ලදී. මෙයින් හඳුරු ද්‍රාවණයක් ලැබිණ. මෙම කාබනික සංයෝගය සම්බන්ධයෙන් වන මින් කුමන ප්‍රකාශය වඩාත් ම උචිත වේ ද?

- (1) සංයෝගයෙහි නයිට්‍රජන් අන්තර්ගතය 10% කි.
 (2) සංයෝගයෙහි ක්වලින් 10% කි.
 (3) සංයෝගයෙහි නයිට්‍රජන් 10% කි.
 (4) සංයෝගයෙහි ක්වලින් 10% කි.
 (5) සංයෝගයෙහි නයිට්‍රජන් සහ ක්වලින් 10% කි.

● 31 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්නවලට උපදෙස්.

31 සිට 40 හෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නයේ දක්වා ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර අතුරින් එකක් හෝ වෙනත් සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි ය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය හෝ ප්‍රතිචාර කවරේ දැයි නිගමනය කරන්න.

- (a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද
 (b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද
 (c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද
 (d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද

ප්‍රතිචාර එකක් පමණක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද (x) කවරක් ලකුණු කරන්න.

උපදෙස් සම්බන්ධතා				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි	ප්‍රතිචාර එකක් පමණක් හෝ වෙනත් හෝ ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි

31. මින් කුමන සමීකරණ/සමීකරණ දලයේ නියමයට අනුකූල වේ ද?

- (a) $\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0} = x_A$ (b) $\frac{P_A^0 - P_A}{P_A} = x_B$ (c) $\frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0} = x_A$ (d) $P_1 = x_1 P_1^0$

32. ඩියුටනෝන් මේසේ ලබා ගත හැකි ය:
- (a) ඩියුටන්-2-මීල් හයිඩ්‍රජන්හරණය සිරීමෙන්
 (b) ඩියුටන්-1-මීල් ඔක්සිකරණය සිරීමෙන්
 (c) ඩියුටනොයින් අම්ලය හයිඩ්‍රජන්හරණය සිරීමෙන්
 (d) ඩියුටනොයින් ස්ලෝරයිඩ් ඔක්සිකරණය සිරීමෙන්.
33. මින් කුමක්/කුමන ඒවා රත් සිරීමෙන් NO_2 ලැබේ ද?
- (a) CaNO_3 (b) $\text{Ba(NO}_3)_2$ (c) $\text{Ni(NO}_3)_2$ (d) NH_4NO_3
34. මින් කුමක්/කුමන ඒවා සමඟ බෙන්සොයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරයි ද?
- (a) NaNO_2/HCl (b) Ba(OH)_2 (c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ (d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$
35. මින් කුමක්/කුමන ඒවා සමඟ NO_2 ප්‍රතික්‍රියා කරයි ද?
- (a) C (b) Mg (c) HI (d) KMnO_4
36. සබන් සම්බන්ධයෙන් වන මින් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?
- (a) සබන්වල $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{COO}^- \text{Na}^+$ සිදුවී හැකි ය.
 (b) සබන් නිෂ්පාදනයේ අකුරු ඵලයක් වශයෙන් හ්ලයිඩෝල් ලැබේ.
 (c) සබන් නිෂ්පාදනයේ දී H_2 වායුව අවශ්‍ය වේ.
 (d) ප්‍රොපේන්-1,2,3-ට්‍රයිමීල් සබන් සර්මාන්තයෙන් ලබා ගත හැකි ය.
37. අනුමාපන ප්‍රභවයක් ඇති ප්‍රභවය මේසිල් ඇමයින් සහ ඩියුරෝට්‍රිවක ඇති ප්‍රභවය ප්‍රියල්ලුමොරොර්කනොයින් අම්ලය අතර අනුමාපනය සම්බන්ධයෙන් වන මින් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
- (a) මේ අනුමාපනයේ දී කැපී පෙනෙන pH විපර්යාසය 10 - 8 පමණ පරාසයේ දී සිදු වේ.
 (b) මේ අනුමාපනයේ දී කැපී පෙනෙන pH විපර්යාසය 9 - 4 පමණ පරාසයේ දී සිදු වේ.
 (c) මේ අනුමාපනය සඳහා මේසිල් රෙඩ් උච්ඡ දර්ශකයක් වේ.
 (d) මේ අනුමාපනය සඳහා පිනෝල්ප්කැලීන් උච්ඡ දර්ශකයක් වේ.
38. ^{18}O සම්ප්‍රදායිකව මගින් සලකුණු කරන ලද එතනෝල් සහ සලකුණු හෝ කරන ලද එතනොයින් අම්ලය සාන්ද්‍ර H_2SO_4 හමුවේ දී ප්‍රතික්‍රියා කර වන ලදී. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් වන මින් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
- (a) මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලයක් වශයෙන් සෑදෙන ප්‍රභවය ^{18}O සිදුවේ.
 (b) මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලයක් වශයෙන් සෑදෙන එස්ටරය විසිරණශීලී වේ.
 (c) මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලයක් වශයෙන් සෑදෙන එස්ටරයෙහි ^{18}O සිදුවේ.
 (d) මේ ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය හෝ ඩී ඉසිරි වන එතනොයින් අම්ලයෙහි ^{18}O හැක.
39. $\text{Mg(s)} \mid \text{Mg}^{2+} (\text{aq}, 0.001 \text{ mol l}^{-1}) \mid \text{Cu}^{2+} (\text{aq}, 1.0 \text{ mol l}^{-1}) \mid \text{Cu(s)}$
- ගත කෝෂය සලකන්න. මේ කෝෂය සම්බන්ධයෙන් වන මින් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?
- (a) ඔක්සිකරණය Mg ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ දී සිදු වේ.
 (b) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවට සිදු වන විට තාපය මුක්ත වේ.
 (c) ඔක්සිකරණය Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ දී සිදු වේ.
 (d) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවට සිදු වන විට තාපය අවශෝෂණය වේ.
40. ආම්ලික මාධ්‍යයේ දී H_2S මගින් අවක්ෂේප වන්නේ මින් කුමන කැටායනය/කැටායන ද?
- (a) Ni^{2+} (b) Zn^{2+} (c) Ag^+ (d) Pb^{2+}






- 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල වගන්ති දෙක බැගින් දී ඇත. එක් එක් ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් දී ඇති වගන්ති යුගලයට හොඳින් ● හැඳුනවුණේ සහක වශුවෙහි දක්වන (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන කවර විස්තර දැයි සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

පළමු වැනි වගන්තිය	දෙ වැනි වගන්තිය
(1) සකාය ය.	සකාය වන අතර පළමුවැන්න නිවැරදි ව පහද දෙයි.
(2) සකාය ය.	සකාය වන නමුත් පළමුවැන්න නිවැරදි ව පහද නොදෙයි.
(3) සකාය ය.	අසකාය ය.
(4) අසකාය ය.	සකාය ය.
(5) අසකාය ය.	අසකාය ය.

පළමු වැනි වගන්තිය	දෙ වැනි වගන්තිය
41. බෙන්සොනයිට්‍රයිල් නයිට්‍රොකරණ මිශ්‍රණය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර වීමෙන් 2— සහ 4— නයිට්‍රො ව්‍යුත්පන්න ලැබේ.	නයිට්‍රයිල් කාණ්ඩය බෙන්සීන් කාණ්ඩය වෙතට ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරයි.
42. $C_6H_5COCH_3$ වලින් එසිල්බෙන්සීන් ලබා ගත හැකි ය.	$C_6H_5COCH_3$ හි කාබොනිල් කාණ්ඩය Fe / HCl මගින් $-CH_2-$ කාණ්ඩය බවට මත්ස්‍යකරණය වේ.
43. LiH සහ D_2O අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සංඥාව HD ලැබේ.	LiH හි නයිට්‍රයිඩ් ඇනායනය ඇති අතර, D_2O වලින් ප්‍රතික්‍රියාවට D^+ සැපයේ.
44. සීටා සිරණවල විනිවිද යාමේ බලය ඉතාමත් ඉහළ වේ.	සීටා සිරණ යනු ඉහළ වේගවලින් ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන වේ.
45. ආවරිත වශුවේ දීර්ඝ ආකාරයෙහි 4 වැනි ආවරකයේ මූලද්‍රව්‍ය 18 ක් තිබේ.	4 වැනි කක්ෂ මීටරම් කුඩා ඇතුළු විය හැකි වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18 ක් පමණකි.
46. Cu^{2+} සහ Al^{3+} කැටායන ජලීය ඇමෝනියා උපයෝගී කර ගනිමින් වෙන් කර ගත හැකි ය.	$Al(OH)_3$ උග්‍රයාමේ ලක්ෂණ දක්වයි.
47. න්‍රෝලය ආසවනය මගින් කුරුඳු කෙළ වෙන් කර ලබා ගත හැකි ය.	කුරුඳු කෙළෙහි වාෂ්ප පීඩනය ජලය හමුවේ දී ඉහළ යයි.
48. $SOCl_2$ සමඟ $CH_2=CH-CH_2-OH$ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.	$CH_2=CH-CH_2-OH$ අසන්තෘප්ත සංයෝගයකි.
49. PF_3 අඤ්ච කළීය වේ.	PF_3 හි දී පොසෆරස් මු-සංයුජ වේ.
50. $Ca(HCO_3)_2$ වලට ස්ථායීකරණ ක්‍රියාව දක්විය නො හැකි ය.	$Ca(HCO_3)_2$ මගින් ජලීය ක්ෂාර උද්දීන නො වේ.

51. සාපේක්ෂ අඤ්ච ස්කන්ධය M වන හා පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන වායුවක් T යන උෂ්ණත්වයේ හා P යන පීඩනය යටතේ තබා ඇත. වායුවේ ඝනත්වය
- (1) $\frac{PR}{MT}$ වේ. (2) $\frac{PT}{MR}$ වේ. (3) $\frac{M}{PRT}$ වේ. (4) $\frac{PTM}{R}$ වේ. (5) $\frac{PM}{RT}$ වේ.
52. ස. උ. පී. දී එකවින් 1120 ml පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍ය වී තිබේ. එකවින් පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස හැසිරේ නම්, මේ සඳහා කැල්සියම් කාබයිඩ් හෝ පමණ අවශ්‍ය වේ ද? ($Ca = 40$; $C = 12$)
- (1) 6.4 g (2) 5.6 g (3) 3.2 g (4) 2.8 g (5) 1.6 g






53. P හමුකි කාබනික සංයෝගය NaNO_2 සහ හඟුන HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර වූ ඒට Q හමුකි සංයෝගය සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව ලැබේ. Q ජීනෝලයක් නො වේ. Q ඔක්සිකරණය කිරීමෙන් R ලැබේ. R සහ $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමඟ රත් කළ විට වෙර්ලිනිලට සමානකම් දැක්වන ද්‍රව්‍යයක් ලැබේ. P මින් සුමන් විය හැකි ද?



54. ප්‍රෝටීන සම්බන්ධයෙන් වන මින් සුමන ප්‍රකාශය සාරදෘෂ වේ ද?

- (1) ප්‍රෝටීනවල හයිඩ්‍රජන් සිබේ.
- (2) ප්‍රෝටීනවල $-\text{CO}-\text{NH}-$ ඇදුම සිබේ.
- (3) ප්‍රෝටීනවල හිදුකේ $-\text{COOH}$ කාණ්ඩ සිබේ.
- (4) ප්‍රෝටීනවලින් ලැබෙන ඇල්සා ඇමයිනෝ කාබොක්සිලික් අම්ල සියල්ල ම ප්‍රකාශ සක්‍රීය ආකාරවලින් පවතී.
- (5) සියලු ම ප්‍රෝටීනවලින් 2- ඇමයිනෝ කාබොක්සිලික් අම්ල ලබා ගත හැකි ය.

55. මේවා ප්‍රතිකාරකය පිළියෙල කිරීම සඳහා මින් සුමන් උපයෝගී කෙරේ ද?



56. ස්ලිය Fe^{2+} සහ ස්ලිය Fe^{3+} රසායනික වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන මින් සුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- (1) ස්ලිය NaOH උපයෝගී කර ගත නො හැකි ය.
- (2) ස්ලිය NH_3 උපයෝගී කර ගත නො හැකි ය.
- (3) ඔරෝමින් දීර්ඝ උපයෝගී කර ගත නො හැකි ය.
- (4) Br_2/CCl_4 උපයෝගී කර ගත හැකි ය.
- (5) ස්ලිය $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ උපයෝගී කර ගත හැකි ය.

57. M හමුකි ලෝහයේ ජලාවර්ධකයේ 49.6 % M සිබේ. M හි කාම ධාරිතාව $0.45 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ වේ. මින් සුමන් M විය හැකි ද?

- (සැ. සු. $F = 19.00$; ලෝහවල මවුලික කාම ධාරිතාව $= 26 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
- (1) Mg (2) Al (3) Cu (4) Fe (5) Zn

58. දෙන ලද සාන්ද්‍ර කැබ්ටරොක්ෆෝරික් අම්ලය ද්‍රාවණයක බර අනුව 38 % HCl සිබේ. මෙම ද්‍රාවණයෙහි ඝනත්වය 1.2 g ml^{-1} වේ. 0.10 mol l^{-1} HCl 250 ml පිළියෙල කර ගැනීම සඳහා උක්ත සාන්ද්‍ර කැබ්ටරොක්ෆෝරික් අම්ලය ද්‍රාවණයෙන් කොපමණ අවශ්‍ය වේ ද?

- (1) 2.0 ml (2) 2.5 ml (3) 8.0 ml (4) 10 ml (5) 20 ml

59. CCl_4 හි ද්‍රවණය කරන ලද අසංතෘප්ත දූමි පැහැය ස්ලිය NaOH මගින් ඉවත් කෙරේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී

- (1) I_2 ප්‍රබල අම්ලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- (2) I_2 ඔක්සිකරණයට භාජනය වේ.
- (3) I_2 ඔක්සිකරණයට භාජනය වේ.
- (4) I_2 ඔක්සිකරණයට හා ඔක්සිකරණයට යන දෙකට ම භාජනය වේ.
- (5) ඉහත සඳහන් කිසිවක් සිදු නො වේ.

60. ඇමෝනියා කාර්මික ව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගනු ලබන උත්ප්‍රේරකය සම්බන්ධයෙන් වන මින් සුමන ප්‍රකාශය වඩාත් ම උචිත වේ ද?

- (1) උත්ප්‍රේරකය මගින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වන උෂ්ණත්වය අඩු කෙරේ.
- (2) උත්ප්‍රේරකය මගින් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අවශ්‍ය පීඩනය අඩු කෙරේ.
- (3) උත්ප්‍රේරකය මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීයතා ගන්තිය අඩු කෙරේ.
- (4) ඉහත (1), (2) සහ (3) යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.
- (5) ඉහත (2) සහ (3) පමණක් සත්‍ය වේ.